

FICHE ENGAGEMENT DE PIÉGEAGE DE PRINTEMPS DES FRELONS ASIATIQUES

Cette fiche est proposée par le GDSA 76 et sera utilisée lors de la mise à disposition des pièges auprès des adhérents piégeurs.

Je soussigné(e) :	Prénom :			NOM :			
	Adresse :	Rue :					
CP :			Commune :				
Reconnais avoir pris connaissance du protocole de piégeage dans le cadre du Plan National de Lutte contre le Frelon Asiatique proposé par le GDSA 76			<i>Fait en deux exemplaires,</i>			Signature,	
			A :				
			Le :				

FICHE PIÉGEUR 2023

Cette fiche permet au piégeur de noter régulièrement le nombre de frelons piégés

Localisation du piège :	Lieu :				
	CP :		Commune :		
Type d'appât utilisé :					
Remarques :					

RELEVÉ de PIÉGEAGE

Dates	Écart entre les relevés - Nb de jours)	Nombre de frelons			Autres insectes	Observations
		Asiatiques	Européens	Orientalis		
1	<i>Date de la pose</i>			<i>Prendre photo</i>		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
TOTAL :						

Une copie de ce relevé est à transmettre en fin de campagne (printemps et automne) afin consolider le recueil de données et valider la méthode à **Catherine BÉRRUBÉ** et **Jacky BOURGEOIS** : tresorgdsa@gmail.com; jacky.bourgeois@wanadoo.fr. Le référent technique au GDSA 76 est Nicolas ROUSSELIN nicolas.rousselingdsa76@gmail.com. Merci pour votre collaboration et le respect du protocole,

PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES FRELONS ASIATIQUES

FICHE PROTOCOLE DE PIÉGEAGE

PÉRIODE POUR PIÉGER : 2 MOIS AU PRINTEMPS

- Entre le 1^{er} février et le 31 mai
- Piégeage des reines fondatrices, pour éviter la construction de nids secondaires
- Débuter et arrêter le piégeage selon le climat et les températures (minimum 12 degrés)

7 RÈGLES POUR INSTALLER ET GÉRER MON PIÈGE

1. Au soleil, avec des pièges nasses possédant des entrées et sorties sélectives
2. À côté d'une source de nourriture (fleurs printanières, arbres et arbustes mellifères en fleur...) ou d'une source d'eau ou d'un rucher. Ne pas hésiter à déplacer le piège en fonction de la floraison
3. Orientation de la grille latérale Sud / Sud-Est
4. Légère inclinaison vers l'avant pour l'évacuation de l'eau
5. Placement de l'appât à l'intérieur du piège et renouvellement tous les 8-10 jours
6. Si vous devez vider le piège : le placer de préférence 1 heure au congélateur ou noyer le piège dans l'eau (remettre quelques frelons intacts dans le piège)
7. À proximité des anciens nids

APPÂTS SUCRÉS À PRIVILÉGIER AU PRINTEMPS

L'appât doit attirer des frelons, qui vont ensuite eux-mêmes attirer d'autres frelons, grâce aux phéromones qu'ils produisent. Il ne faut donc pas vider le piège, tant qu'il y a des frelons vivants dedans. Un appât sucré pendant le piégeage de printemps :

- Mélanger : 1/3 bière brune ou panaché, 1/3 sirop de cassis ou grenadine, 1/3 vin. Ajouter du jus de fonte des cires
- La bière, pour la fermentation qui favorise la dispersion de l'odeur du sucre
- Le sirop, pour le sucre nécessaire à la nourriture des larves de frelon asiatique. Ce sirop peut-être avantageusement remplacé par du sirop de nourrissage des abeilles (plus appétent)
- Le vin, répulsif pour les abeilles.

SUIVI ÉVALUATION DES CAPTURES : UNE OBLIGATION

(Voir au dos : Fiche Piégeur 2023)

Les données seront transmises à :

tresor.gdsa@gmail.com; et
jacky.bourgeois@wanadoo.fr;

en charge du recueil des données du plan de lutte contre le Frelon Asiatique au sein du GDSA 76.

Votre référent Frelon au GDSA 76 est :

nicolas.rousselingdsa76@gmail.com

Comptage hebdomadaire : Le tableau de suivi (fiche piégeur) devra indiquer :

- L'identité et l'adresse du piégeur
- Le nombre d'individus capturés
- La distinction entre frelons asiatiques, frelons européens (espèce qui apparaît fin avril début mai) et espèces non- cibles
- Le lieu où le piège était positionné
- La nature de l'appât utilisé
- La durée du piégeage

CONDITIONS D'UTILISATION DU PIÈGE

Voir fiche des bonnes pratiques de piégeage de printemps. Un suivi des résultats sera assuré par un référent coordinateur local.

Une fiche comparative piégeage de printemps et destruction des nids sera établie en fin d'année.

